

의약품 분류번호	232 소화성궤양용제
-------------	----------------

위산과다 · 위역류 · 속쓰림 · 소화불량

위엔젤 데블액션

현탁액

일반의약품

• 원료약품의 분량 : 이 약 100mL 중

알긴산나트륨(EP).....	5.0g(건조물로서4,25g)
탄산수소나트륨(EP).....	2.13g
탄산칼슘(EP).....	3.25g
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	8.0mg
파라옥시벤조산프로필(KP).....	2.0mg

- **성상** : 페퍼민트향이 나는 미황색(연노랑)~크림색의 현탁액
- **효능·효과** : 위역류, 속쓰림, 소화불량, 위산과다 등의 증상 개선
- **용법·용량** : 성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 4회(식후 및 취침전)에 각각 10~20mL(1~2포)를 복용
- **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
이 약의 구성성분에 과민한 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
1) 울혈성심부전, 신부전 등과 같이 나트륨을 매우 제한해야 하는 환자(이 약은 20mL당 254.5mg(11.06mmol)의 나트륨을 함유)
2) 고칼슘혈증, 신석회침착증(nephrocalcinosis)과 재발성 칼슘함유 신결석(recurrent calcium containing renal calculi) 환자(이 약은 20mL당 260mg(6.5 mmol)의 칼슘을 함유)
3) 12세 미만의 어린이에 대한 투여는 의사의 지시가 아니면 일반적으로 추천되지 않습니다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오, 상당 시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약에 민감한 매우 극소수의(1/10,000)환자에게서 소양증(가려움증)이나 기관지 수축, 아나필락시스 반응과 같은 알려지지 않은 반응이 일어날 수 있습니다.
2) 탄산칼슘을 대량 섭취할 경우, 알칼리증, 고칼슘혈증, 산반동(반작용으로 인한 위산과다분비), 우유알칼리증후군 또는 변비가 일어날 수 있습니다. 이는 보통 권장량 이상의 용량을 복용할 경우에 나타납니다.
3) 투약 7일 후에도 증상이 개선되지 않으면 의사와 상의하십시오.
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 과량 투여시 즉시 병원에서 신속한 의학적 처치를 받으십시오. 일부 환자는 복부(배부분)팽만을 호소할 수 있습니다.
2) 제산제인 탄산칼슘의 작용이 있으므로 다른 약물과 2시간의 간격을 두고 복용하십시오.(예: H2 항히스타민제, 테트라사이클린, 디곡신, 플루오로퀴놀론, 철염(iron salt), 케토코나졸, 신경이완제(neurdeptics), 치목신, 페니실라린, 베타차단제(아테놀올, 메토프롤, 프로피롤), 글루코코르티코이드, 클로로퀸 및 디포스포네이트(diphosphonates)
3) 임신여성에게 투여시 임신부나 태아 혹은 신생아에서 어떠한 이상반응도 관찰되지 않았습니다.
4) 동물실험에서 발암성이 있는 것으로 나타난 삭카린을 함유하고 있어 건강에 해로울 수 있습니다. (감미제로서 삭카린이 함유되어 있습니다.)

5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아서 보관하십시오.
3) 이 약은 개봉 후 6개월 이내에 사용하십시오.

- **포장단위** : 1포(10mL) X 자사포장단위
- **저장방법** : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관(냉장보관하지 마십시오)
- **제조의뢰자** : 제이더블유중외제약(주) / 충남 당진시 송악읍 한진1길 56
- **제조사** : 한국콜마(주) / 세종특별자치시 전의면 산단길 245
- **교환 및 제품문의**

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질·부패 또는 오손된 제품등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오. 연락처:고객보호팀 1588-2675

※첨부문서 작성년월일: 2014년 7월 8일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (www.jw-pharma.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자



제이더블유중외제약(주)
충남 당진시 송악읍 한진1길 56